



Vejledning til patienter



Indikation:

Froidir er receptpligtig medicin til:

- behandling af patienter med skizofreni, hvor anden medicin ikke har virket.

Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Denne medicin kan kun bruges til behandling af skizofreni, hvis du allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotisk medicin, herunder en af de nyere "atypiske" antipsykotika, og disse ikke har virket eller har givet alvorlige bivirkninger, der ikke kunne behandles.

- behandling af voldsomme forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel hos personer med Parkinsons sygdom, hvor anden medicin ikke har virket.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

VIGTIG ADVARSEL:

BRUGEN AF CLOZAPIN MEDFØRE EN BETYDELIG RISIKO FOR AT UDVIKLE FØLGENDE:

AGRANULOCYTOSE

- Agranulocytose er en sygdom i blodet, hvor knoglemarven (blødt væv inde i knoglen, der danner blodlegemer) ikke danner nok af en bestemt type hvide blodlegemer, kaldet neutrofiler, som bekæmper infektion. Agranulocytose kan medføre alvorlige infektioner og dødsfald.
- Du skal ikke tage Froidir, hvis du tidligere har oplevet agranulocytose, på grund af clozapin.
- Du skal kontakte en læge omgående, hvis du udviser tegn på forkølelse, feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller andre symptomer på infektion under behandlingen med Froidir. Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få undersøgt, om dine symptomer er forbundet med din medicin.
- Før du starter med at tage Froidir, vil din læge tale med dig om din sygdomshistorie og tage en blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodlegemer er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette, da din krop har brug for hvide blodlegemer til at bekæmpe infektioner.
- Froidir kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodlegemer ("agranulocytose"). Kun regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.
- I de første 18 uger af behandlingen er blodprøver nødvendige én gang om ugen. Derefter er blodprøver nødvendige mindst én gang om måneden.
- Hvis der sker et fald i antallet af hvide blodlegemer, skal du straks stoppe med at tage Froidir. Antallet af hvide blodlegemer bør derefter vende tilbage til det normale.
- Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med Froidir-behandlingen.


MYOKARDITIS OG KARDIOMYOPATI:

- Froidir kan give betændelse i hjertemusklen (“myokarditis”) og forstørrelse af hjertemusklen (“kardiomyopati”), som kan være dødeligt. Kontakt din læge omgående, hvis du har hurtige eller uregelmæssige hjerteslag, selv når du hviler, eller hvis du har hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, brystmerter eller uforklarlig træthed. Din læge vil undersøge dit hjerte og om nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

06.03.2019/AK



PROOF COLOURS

-  PANTONE 316 C
-  PANTONE 130 C
-  PANTONE 3275 C
-  PANTONE BLUE 072 C
-  Black

SIZE: 148 x 210 mm

Font: Arial

Minimum font size: 10 pt