

PATIENTKORT

Apixaban Orion (apixaban)

- Du/vårdaren ska alltid ha med detta patientkort
- Se till att det är den senaste versionen

Bär med dig detta kort vid alla tillfällen.
Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och
för all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig.

**Jag behandlas med Apixaban Orion
(apixaban) ett antikoagulantium
för att förhindra blodproppar.**

INFORMATION TILL PATIENTEN

- Ta Apixaban Orion regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta den så snart du kommer ihåg det och den kan tas tillsammans med kvälldosen. En missad kvälldos kan bara tas under samma kväll. Ta inte två doser nästa morgon, utan fortsätt att följa ditt doseringsschema två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta Apixaban Orion utan att rådfråga läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
- Apixaban Orion hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart**.
- Om du är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du använder Apixaban Orion.

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL

- Apixaban Orion (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Orion kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixaban-behandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Orion kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringstest rekommenderas inte) – se produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts för pediatriska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).

VÄNLIGEN Fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn _____

Födelsedatum _____

Indikation _____

Dos _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn _____

Läkarens telefonnummer _____