

POTILASKORTTI

Apixaban Orion (apixabaani)

- Tämän kortin on oltava aina potilaan tai potilasta hoitavan henkilön mukana
- Varmista, että käytössäsi on viimeisin versio

Pidä tämä kortti aina mukanasasi.
Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle,
hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle
terveydenhuollon ammattilaiselle.

**Saan verenhyytymistä estävää
Apixaban Orion -hoitoa (apiksabaani)
verisuonitukosten estämiseksi.**

TIETOA POTILAILLE

- Ota Apixaban Orion säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat aamuannoksen, ota se heti kun muistat. Se voidaan ottaa yhdessä iltä-annoksen kanssa. Unohtuneen iltä-annoksen saa ottaa vain samana iltana. Älä ota seuraavana aamuna kahta annosta, vaan jatka seuraavana päivänä hoitoa suositellun tavanomaisen aika-
taulun mukaan kahdesti vuorokaudessa.
- Älä lopeta Apixaban Orion -valmisteen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.
- Apixaban Orion -valmiste auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuoto-
riskiäsi.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäveren-
vuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai veri-
oksennus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, **hakeudu heti hoitoon.**
- Jos tarvitset leikkaushoitoa tai sinulle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärille, että käytät Apixaban Orion -valmistetta.

TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Apixaban Orion (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.
- Apixaban Orion saattaa suurentaa verenvuoto-
riskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Apixaban Orion -hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannos-
tuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, antifaktori Xa-määrittämisestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplas-
tiiniaika (aPTT) – katso valmisteyhteenvedo.
- Aikuisille on saatavilla apiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden kumoava aine, mutta sen turvallisuutta ja tehoa pediatriassa potilailla ei ole varmistettu (ks. andeksaneetti alfan valmisteyhteenvedo).

OLE HYVÄ JA TÄYTÄ TÄMÄ OSIO ITSE TAI PYYDÄ LÄÄKÄRIÄ TEKEMÄÄN SE

Potilaan nimi

Syntymäaika

Käyttöaihe

Annos _____mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi

Lääkärin puhelinnumero