

**TÄMÄ POTILASKORTTI ON TARKOITETTU VAIN
POTILAILLE, JOTKA KÄYTÄVÄT METOTREKSAATTIA
SISÄLTÄVÄÄ LÄÄKETTÄ NIVELREUMAN JA PSORIAASIN
HOITOON. JOS KÄYTÄT METOTREKSAATTIA JONKIN
EDELLÄ MAINITUN KÄYTTÖAIHEEN HOITOON,
OTA METOTREKSAATTIA VAIN KERRAN VIKOSSA.**

Kirjoita täähän sen viikonpäivän nimi, jolloin otat lääkkeen:

Älä ylitä määrätyyä annosta.

Yliannostus voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja johtaa jopa kuolemaan. Yliannostuksen oireita ovat esimerkiksi kurkkukipu, kuume, suun haavaumat, ripuli, oksentelu, ihottumat, verenvuoto tai epätavallinen heikotus. Jos luulet ottaneesi määrätyyä annosta suuremman annoksen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Näytä tämä kortti aina sellaisille terveydenhuollon ammatilaisille, jotka eivät ole perehtyneet metotreksaattihoitoosi, jotta he ovat tietoisia kerran viikossa tapahtuvasta annostelusta (esim. sairaalaan mentäessä, hoidon muuttuessa).

Lue lisätiedot pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta.

*Metotreksaattia koskeva potilaskortti, versio 1.0
Tammikuu 2020, Fimean hyväksymä 14.01.2020*



**DETTA PATIENTKORT ÄR ENBART AVSETT FÖR
PATIENTER SOM ANVÄNDER ETT METOTREXAT-INNE-
HÅLLANDE LÄKEMEDEL FÖR REUMATOID ARTRIT OCH
PSORIASIS. OM DU ANVÄNDER METOTREXAT FÖR
NÅGON AV OVANSTÅENDE INDIKATIONER SKA DU
TA METOTREXAT ENDAST EN GÅNG I VECKAN.**

Skriv här hela namnet på veckodagen då läkemedlet ska tas:

Ta inte mer än den ordinerade dosen.

Överdosering kan leda till allvarliga biverkningar och kan få dödlig utgång. Symtom på överdosering kan vara t ex halsont, feber, sår i munnen, diarré, kräkningar, hudutslag, blödningar eller onormal svaghet. Om du tror att du kan ha fått i dig mer än den ordinerade dosen, sök läkare omedelbart.

Visa alltid detta kort vid kontakt med vårdpersonal som inte är insatta i din metotrexatbehandling och gör dem uppmärksamma på att du tar läkemedlet en gång i veckan (t ex vid inläggning på sjukhus eller vid byte av vårdgivare).

För mer information, läs bipacksedeln som finns i förpackningen.

