

PATIENTKORT

Apixaban Orion (apixaban)

- Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren

Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren.

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal som före behandling.

Jag behandlas med Apixaban Orion (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar.

INFORMATION TILL PATIENTERN/ VÅRDNADSHAVARE

- Ta/ge Apixaban Orion regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas/ges tillsammans med kvälldosen. En missad kvälldos kan bara tas/ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa doseringsschemat två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta/ge Apixaban Orion utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke, blodpropp eller andra komplikationer.
- Apixaban Orion hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart**.
- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder Apixaban Orion.

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL

- Apixaban Orion (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban Orion kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixaban-behandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban Orion kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koagulerings-test rekommenderas inte) – se produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av apixabans anti-faktor Xa-aktivitet finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts för pediatriska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).

VÄNLIGEN Fyll i detta avsnitt eller be läkaren att göra det

Namn _____

Födelsedatum _____

Indikation _____

Vikt _____ kg

Dos _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn _____

Läkarens telefonnummer _____