

POTENSIALE FOR IKKE-MEDISINSK BRUK OG AVVIKENDE BRUK AV RESEPTBELAGTE SENTRALSTIMULERENDE LEGEMIDLER

Reseptbelagte sentralstimulerende legemidler, som amfetaminer og metylfenidat, forskrives ofte til behandling av attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Som for alle reseptbelagte legemidler er riktig bruk av sentralstimulerende legemidler viktig. Sentralstimulerende legemidler kan forårsake en rekke mulige bivirkninger hvis de ikke brukes riktig. Hvis de for eksempel tas i høye doser eller brukes når det ikke er forskrevet, kan det føre til alvorlige helsemessige konsekvenser.

Det er viktig å håndtere reseptbelagte sentralstimulerende legemidler på en forsvarlig måte. De skal ikke selges eller gis bort til andre personer.

Feil bruk av sentralstimulerende legemidler

Feil bruk kan omfatte ikke-medisinsk bruk og avvikende bruk:

Ikke-medisinsk bruk

Feil bruk

Feil bruk beskriver situasjoner når et reseptbelagt legemiddel blir brukt på en annen måte enn den som er forskrevet, for eksempel hvis noen tar en ekstra dose av sitt eget legemiddel eller ikke tar doser som forskrevet.

Misbruk

Misbruk betyr at noen bruker et reseptbelagt legemiddel for å endre måten de føler seg, for eksempel for å bli «høy». Dette kan være farlig for personen som tar legemidlet og for de rundt denne personen.

Avvikende bruk

Avvikende bruk beskriver situasjoner hvor legemidlet som ble forskrevet for å behandle en pasients medisinske tilstand, ikke brukes til tiltenkt bruk. For eksempel hvis noen gir sitt eget reseptbelagte legemiddel eller sitt barns reseptbelagte legemiddel til noen andre.

Hvis **barnet ditt** har fått forskrevet sentralstimulerende legemidler bør du...

- ✓ Forstå så mye som mulig om behandlingen barnet ditt får med sentralstimulerende legemidler
- ✓ Oppbevare legemidlene til barnet på et trygt sted, også på skolen
- ✓ Være klar over hvor mye av legemidlet barnet ditt bruker og hvor ofte. Sørg for at barnet ditt bare tar sentralstimulerende legemidler som det er forskrevet til ham/henne
- ✓ Snakke med barnet ditt om legemidlet regelmessig, inkludert farene ved å bruke det feil og hvilke lover som gjelder i forbindelse med at andre bruker legemidlene
- ✓ Sørge for at ingen andre bruker de sentralstimulerende legemidlene til barnet. Dette kan gjøres ved å telle kapslene regelmessig
- ✓ Diskutere farene ved feil bruk av sentralstimulerende legemidler med familien og legen til barnet

- ✓ Være oppmerksom på eventuelle uvanlige tegn som kan tyde på at barnet bruker legemidlet feil. Barnets lege kan gi deg råd om hvilke typer tegn du skal se etter.
- ✓ Snakke med barnets lege umiddelbart hvis du er bekymret for noen av disse punktene

Hvis **du** har fått forskrevet sentralstimulerende legemidler bør du...

- ✓ Forstå så mye som mulig om behandlingen du får med sentralstimulerende legemidler
- ✓ Oppbevare legemidlene dine på et trygt sted, også på skolen eller studiestedet
- ✓ Være klar over hvor mye av legemidlet du skal ta og hvor ofte
- ✓ Bare ta sentralstimulerende legemidler på den måten legen har foreskrevet
- ✓ Sørge for at ingen andre bruker de sentralstimulerende legemidlene dine. Dette kan gjøres ved å telle kapslene regelmessig
- ✓ Snakke med legen umiddelbart hvis du er bekymret for noe som angår legemidlene dine

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket:

www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Kontaktinformasjon

Orion Pharma AS

tlf.: +47 40 00 42 10

e-post: medinfo@orionpharma.com

Godkjent dato: 04.2023

Versjon 1.0