



Apixaban Orion (apiksaban)

Karta dla Pacjenta

Pacjent/dziecko pacjent/opiekun zawsze powinien mieć tę kartę przy sobie.

Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego przed rozpoczęciem leczenia.

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Apixaban Orion (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Informacja dla pacjentów/opiekunów

- Lek Apixaban Orion należy przyjmować/podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki, należy przyjąć/podać ją od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni i można ją przyjąć/podać jednocześnie z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano; zamiast tego należy kontynuować przyjmowanie/podawanie leku zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.
- Nie należy przerywać przyjmowania/podawania leku Apixaban Orion bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Apixaban Orion pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień, w tym zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bladość lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakiegokolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Apixaban Orion.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Apixaban Orion (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Apixaban Orion może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia dużego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Apixaban Orion nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)).
- Dla osób dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciw czynnikowi Xa, jednak nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz Charakterystyka Produktów Leczniczych zawierających andeksanet alfa).